

# PENYALAHGUNAAN BENZODIAZEPINA DAN OBAT-OBATAN ANALGESIK

Sumber:  
<http://www.samsha.gov>  
[www.dualdiagnosis.org/benzodiazepine-addiction/drugabuse.com](http://www.dualdiagnosis.org/benzodiazepine-addiction/drugabuse.com)  
<http://pionas.pom.go.id/loni/bab-4-sistem-saraf-pusat/41-hipnosis-dan-ansietas>

## APA ITU BENZODIAZEPINA

Benzodiazepina adalah tipe medikasi yang diperkenalkan pada tahun 1950an yang merupakan alternatif yang lebih aman dari Barbiturat.

Bekerja pada Sistem Saraf Pusat (SSP) Depresan

## DAMPAK BENZODIAZEPINA

Dampak Penggunaan Benzodiazepina:




### Beberapa Jenis Benzodiazepina:

Jenis	Merek
1. Alprazolam	1. Xanax
2. Lorazepam	2. Ativan
3. Clonazepam	3. Klonopin
4. Diazepam	4. Valium
5. Nitrazepam	5. Dumolid

## PENYALAHGUNAAN BENZODIAZEPINA MENINGKATKAN POTENSI ADIKSI

Darimana Penyalahguna mendapatkan Benzodiazepina dan Obat-Obatan Analgesik?



### Ketergantungan dan Penghentian Obat

- › Penghentian penggunaan benzodiazepina sebaiknya secara bertahap karena penghentian yang tiba-tiba dapat mengakibatkan disorientasi, gangguan psikosis, kejang atau kondisi mirip delirium tremens.
- › Sindroma gejala putus zat dapat timbul hingga 3 minggu setelah penghentian benzodiazepina. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya insomnia, ansietas, hilangnya nafsu makan dan turunnya berat badan, tremor, berkeringat, tinnitus, dan gangguan persepsi.
- › Penghentian Obat Benzodiazepina dianjurkan dengan konsultasi dan supervisi dokter.

## APA ITU ANALGESIK

Analgesia adalah istilah umum untuk meredakan rasa sakit atau nyeri. Analgesik adalah obat-obatan yang dapat mengurangi atau meredakan rasa sakit.

# TRAMADOL



### Apakah Tramadol?

Tramadol adalah salah satu jenis obat penahan rasa sakit, yang bukan termasuk Narkotik, tetapi perlu rekomendasi dan resep dokter untuk mengonsumsi obat ini. Dikarenakan memiliki potensi penyalahgunaan dan Adiksi.

### Penyalahgunaan Tramadol Dapat menyebabkan:



### Bagaimana Penyalahgunaan Benzodiazepina dan obat-obatan Analgesik?

- Rutin mengonsumsi melebihi dosis
- Konsumsi melebihi dosis
- Mencampur dengan narkoba atau alkohol
- Menyimpan obat untuk dipakai dalam satu waktu
- Tidak minum obat sesuai waktu yang dianjurkan

### Beberapa Jenis Analgesik Yang sering Disalahgunakan:

- Tramadol
- Corisoprodol & PCC (Seperti Somadril, dll)